

# MENUKAART SCHAPENVOER



## SCHAPENBROK CONDITIE

Schapebrok Conditie is een geschikt onderhoudsvoer voor alle productiefasen met extra aandacht voor de vitaliteit van de ooi. Zorg ervoor dat de ooi in goede conditie zijn rondom het dekken. De eerste maanden van de dracht biedt weidegang normaal gesproken voldoende voeding. In de eindfase van de dracht en tijdens de zoogperiode biedt dit voer de ideale aanvulling op ruwvoer.

### VOERADVIES

Volwassen schapen buiten dracht- en zoogperiode kunnen afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer worden bijgevoerd met 200 tot 300g Schapebrok Conditie om te voorzien in noodzakelijke vitaminen en mineralen. Aan dragende ooiën kan in de laatste maand van de dracht dagelijks 200 tot 500 g per dag Schapebrok Conditie worden bijgevoerd.



## SCHAPENBROK LACTO

Schapebrok Lacto is bedoeld voor ooiën in de laatste maand van de dracht en zogende ooiën. Schapebrok Lacto is bij uitstek geschikt voor melkziekte gevoelige schapenrassen, rassen die veel meerlingen krijgen (bijvoorbeeld Swifters en Flevolandse) en voor rassen die een hoge melkgift hebben (zoals Suffolks). Met Schapebrok Lacto wordt extra eiwit, energie en calcium verstrekt. Dit resulteert in goed werkende ooiën rond de geboorte, vitale lammeren en kan helpen melkziekte te voorkomen. Bouw een krachtvoergift bij schapen op stal altijd geleidelijk op zodat de spijsvertering zich kan aanpassen.

### VOERADVIES

De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van ras, buitentemperatuur en van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoer. Richtlijn einde dracht:

- 100g per dag 4 tot 2 weken voor het werpen,
- 300g per dag vanaf 2 tot 1 week voor het werpen.
- 500g per dag laatste week van de dracht.

Richtlijn zoogperiode; Eerste week na aflammeren 1kg per dag. Daarna voerhoeveelheid afstemmen op aantal lammeren. Bij een ooi met eenling 700g per dag, bij een ooi met tweeling 1kg per dag. Maximaal 1,3kg per dag bij een drieling. Zorg altijd voor voldoende ruwvoer van goede kwaliteit en voor vers en schoon drinkwater.



# MENUKAART SCHAPENVOER



## LAMMERENKORREL GROEI

Lammerenkorrels Groei is een aanvullend diervoeder voor vleeslammeren en opgroeiende oaien. Lammerenkorrel Groei is een smakelijke korrel die graag wordt opgenomen door jonge lammetjes waardoor de ontwikkeling van de magen al vroegtijdig gestimuleerd wordt. De samenstelling is zeer energierijk zodat een maximale (snelle) groei kan worden gerealiseerd.

### VOERADVIES

Vanaf circa veertien dagen leeftijd kan Lammerenkorrels groei worden bijgevoerd naast melk of kunstmelk en onbeperkt ruwvoer. Voer Lammerenkorrels Groei naar behoefte, onbeperkt bij. Zorg altijd voor ruim voldoende ruwvoer van een voedzame kwaliteit en voor vers en schoon drinkwater.



## LAMMERENMELK NOVILAM 50

In het begin is de lebmaag van een schapenlam veel groter dan zijn andere magen, daarom is een lam meer gevoelig voor het soort voer dat het krijgt. Om er zeker van te zijn dat de melk op de juiste manier wordt verteerd en opgenomen is voor schaaplammeren een kunstmelk met magere melkpoeder zeker aan te raden. Op een leeftijd van 20 weken zijn de verhoudingen tussen de magen significant veranderd en is de lebmaag de kleinste maag.

Deze kunstmelk is geschikt voor moederloze opfok van lammeren of als bijvoeding wanneer de ooi niet in staat is om de lammeren zelf van voldoende melk te voorzien. Dit is bij een drieling of vierling vaak het geval. Deze melk blijft 24 uur stabiel en is daardoor bij uitstek geschikt voor voorraadvoeding. De zoete kunstmelk heeft een goede geur en smaak. Dit zorgt voor een hoge opname door de lammeren waardoor een maximale maar veilige groei bereikt kan worden.

### AANDACHTSPUNTEN BIJ DE OPFOK VAN LAMMEREN

- Ontsmet de navel direct na de geboorte.
- Verstrek ca. 150 cc biest uiterlijk 2 uur na geboorte.
- Geef de eerste dagen niet meer dan 10-15% van het lichaamsgewicht aan hoeveelheid melk verdeeld over 3 voedingen per dag.
- Zorg voor een goede hygiëne van emmer, garde, maatbeker en mixer.
- Water warmer dan 70°C geeft risico van beschadiging van eiwitten en vetten.
- Verstrek vanaf de tweede week de smakelijke Lammerenkorrel Groei, goed ruwvoer en fris drinkwater.

- GESCHIKT VOOR EMMER-, SPEEN- EN MACHINEVOEDERING • BEVAT 50% MAGERE MELKPOEDER •
- VOOR MAXIMALE GROEI • MELKVERVANGER VOOR SCHAPEN- EN GEITENLAMMEREN •



### BEREIDINGSWIJZE

- BIJ SCHAPEN** • 180-200gr poeder per liter water
- BIJ GEITEN** • 140-160gr poeder per liter water
- MENGTEMPERATUUR** • 45-55°C, krachtig mixen
- DRINKTEMPERATUUR** • 40-41°C te zijn